

## CODE DE BONNE CONDUITE DU SPÉLÉOLOGUE EN PRÉSENCE DE CHIROPTÈRES.

Extraits de recommandations du C.D.S du Lot, applicables en Région Centre:

**S'il est certain que le spéléo vulgaris adore les chauves-souris,  
l'inverse n'est peut-être pas toujours vrai ...**

**En effet, imaginez qu'une bande d'énergumènes bruyants débarque chez vous à 3h du mat, alors que vous êtes plongé au plus profond de votre sommeil paradoxal ? c'est à peu près l'impression que ça doit faire à une colonie-famille de chiroptères lorsqu'un groupe d'une quinzaine de spéléos envahit brusquement leur salle souterraine favorite.**

**Notamment lorsqu'elles sont en pleine hibernation !**

**Certes, direz-vous, des chauves-souris il y en a partout et dans toutes les grottes, faut-il arrêter la spéléo ? Que non, mais il est simplement recommandé d'éviter la fréquentation de certaines cavités, en certaines périodes déterminées, surtout en groupe ; et aussi d'adopter un comportement spécifique en présence de nos p'tites bestioles, c'est tout.**

### Quelques règles à appliquer :

- J'arrive à l'entrée d'une cavité équipée d'un panneau signalant la présence de chiroptères (placé à l'extérieur pour les gouffres et en début de cavité pour les grottes) Je fais demi-tour si je suis dans une des périodes à ne pas fréquenter .
- Je suis en exploration et rencontre une colonie de chiroptères ( groupe de quelques dizaines à plus de 1000 ) :  
Je fais demi-tour quelle que soit la saison . En effet l'affolement dans une colonie peut être dramatique ( notamment en période estivale de reproduction ) ou un réveil répété hivernal peut être critique : les réserves énergétiques de l'animal peuvent s'épuiser si la cavité reçoit trop de visites en hiver et l'animal mourir .  
Je peux revenir à une autre saison, la présence des chiroptères étant saisonnière .
- Je suis en exploration et rencontre des chiroptères isolés ( parfois une vingtaine ou une trentaine par cavité ) :  
Je poursuis mon exploration en respectant les règles de cohabitation suivantes :
  - Je ne m'attarde pas dans la zone "habitée" .
  - Je ne "réchauffe" pas les bêtes ( pas d'observation directe à la verticale que ce soit avec ou sans acéto ) .
  - Je n'utilise pas une lumière vive ou continue ( plutôt électrique tamisée et de courte durée).
  - Je limite le plus possible les bruits et la parole lors de ma progression dans leur environnement perceptible ( bruits métalliques et bruits de pas sur des caillasses notamment ) .
  - Je fais attention à la présence de chiros dans les passages étroits ( là où ça frotte ) .
  - Enfin règle impérative à respecter : si elles se mettent à bouger ou simplement à faire des tractions avec leurs pattes, alors je m'éloigne au plus vite et en silence afin qu'elles retrouvent le calme dans les plus brefs délais .
  - Si le nombre de chiroptères est assez élevé ( au moins une dizaine ) , j'informe le correspondant chiroptères du C.S.R. Centre (Yvan GILLARD).